Der Garten

... für Mensch und Vogel

Nicht von Pappe

... Grünes aus gutem Hause!



Häussermann
Stauden+Gehölze

Im Kornfeld 4, 71696 Möglingen, Telefon 0 71 41-49 99-0, Telefax 0 71 41-49 99-250, www.haeussermann.com

Zum Nisten und Futtern gut!

Wie soll er aussehen, der Garten für Mensch und Vogel?

Wenn es nach den Vögeln geht, am liebsten stachelig und unordentlich! Ein Brombeergestrüpp bietet einen Rückzugsort von dem sich jeder Feind fern hält. In herumliegendem Laub tummeln sich unzählige Insekten, die als Futter dienen. Astlöcher in abgestorbenen Pflanzenteilen nutzen Höhlenbrüter wie Blau- oder Kohlmeise.

Da unsere heutigen überschaubaren Gärten leider nicht den Platz für solche Szenarien bieten, haben wir hier auch kleinere Ziergehölze zusammengestellt. So finden sich hoffentlich für jeden Garten ein paar Pflanzen, die das Nahrungsangebot und die Brutmöglichkeiten für Vögel verbessern.

Weichfutter fressende Vögel wie Amseln, Rotkehlchen, Zaunkönig und Star ernähren sich von Insekten sowie Beeren und Früchten. Pflanzen Sie z.B. Felsenbirne oder Zierapfel.

Körnerfresser sind ganzjährig auf Samen angewiesen, die zwischenzeitlich äußerst rar geworden sind. Diese Gruppe kann nach heutigem Kenntnisstand (nicht nur im Winter) in Vogelhäusern zugefüttert werden. Natürliche Nahrung (Samen) bieten insbesondere Stauden.

Die nachfolgende Pflanzenliste stellt eine Auswahl an Möglichkeiten dar, um Vögel zu unterstützen. Sie ist nach der Verwendung im Garten gegliedert. Der Nutzen für die Vögel wird aus der angehängten Tabelle ersichtlich.

Inhaltsangabe:

Seite 3 – 5 Ziersträucher
Seite 6 – 9 Sträucher mit Wildcharakter
Seite 10 Bäume
Seite 11 Kletterpflanzen
Seite 12 Stauden
Seite 13 – 14 Tabellarische Übersicht

Ziersträucher

	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Größe
Berberis thunbergii 'Kobold'	**Amelanchier canad.'Rainbow Pillar' -R-**	Felsenbirne	C 5	60- 100
	Straff aufrechter Strauch oder kleiner Baum, 3-5m hoch, 1,5-2m breit; kleine dunkelgrüne, mehltaufreie Blätter mit orange-roter Herbstfärbung; ab Ende April reinweiße Blüten, die Bienen Nektar und Pollen liefern; im Juni / Juli aromatische, essbare Früchte, sie stehen auf dem Speiseplan von Amseln, Drosseln und weiteren Vogelarten, durch den schmalen Wuchs auch für kleine Gärten geeignet			
	Berberis thunbergii 'Kobold'	Grüne Zwerg-Berberitze	C 2	20- 25
	Kugeliger Zwergstrauch, bis 0,5m hoch, im Alter breiter als hoch; sommergrünes Laub mit gelber bis scharlachroter Herbstfärbung; im Mai / Juni gelbe Blüten, die Insekten (Vogelfutter) anlocken, im Herbst zahlreiche rote Früchte, sie haften bis in den Winter und dienen Vögeln als Futter			
	Berberis thunbergii 'Maria' -S-	Gold-Berberitze	C 3	25- 30
	Langsam wachsender Strauch mit schlankem Wuchs, bis 1m hoch; der Blattaustrieb und die jungen Triebe sind rötlich, das Laub dann goldgelb mit orange-roter Herbstfärbung; im Mai / Juni gelbe Blüten, die Insekten (Vogelfutter) anlocken, im Herbst zahlreiche rote Früchte, sie haften bis in den Winter und dienen Vögeln als Futter			
Beeren des Cotoneaster, hier die Sorte 'Blackburn', schmecken nicht so lecker; gibt es im Winter nichts mehr Anderes, sind die Vögel (z.B der Zaunkönig) dann doch dankbar für das Angebot	**Berberis thunbergii 'Orange Rocket' -R-**	Berberitze	C 3	30- 40
	Schlank aufrechter Zwergstrauch mit dichtbuschigem Wuchs, 0,6 - 1m hoch; sommergrünes, orange-rotes Laub; im Mai / Juni gelbe Blüten, die Insekten (Vogelfutter) anlocken, im Herbst zahlreiche rote Früchte, sie haften bis in den Winter und dienen Vögeln als Futter; für die Bepflanzung von Rabatten, Gefäßen und Gräbern geeignet; sehr schön durch die farbenfrohe Belaubung			
	Cotoneaster apiculatus 'Blackburn'	Preiselbeer-Zwergmispel	Stamm C 7,5	Sth. 80
	Bodendecker mit überhängendem Wuchs, meist auf Stämmchen veredelt; kleines, immergrünes Laub; im Mai / Juni übersät mit rosa Blüten, die Insekten (Vogelfutter) anlocken; ab dem Herbst zahlreiche, bis in den Winter haftende, große dunkelrote Beeren, sie dienen Vögeln als Nahrung			
leuchtend rote Herbstfärbung des Cotoneaster horizontalis	**Cotoneaster dammeri 'Evergreen'**	Immergrüne Teppichmispel	P 0,5	8- 10
	Sehr flach wachsender Bodendecker, bis 15cm hoch; kleines, immergrünes Laub; im Mai / Juni übersät mit rosa Blüten, die Insekten (Vogelfutter) anlocken; ab August leuchtend rote Früchte, sie dienen Vögeln als Futter; für Steingarten oder Grabbepflanzung geeignet			
	Cotoneaster horizontalis	Fächer-Zwergmispel	C 3	40- 60
	Niedriger Strauch, fächerförmig verzweigt, 1-1,5m hoch und breit; kleines sommergrünes Laub mit leuchtend orangener bis scharlachroter Herbstfärbung; im Juni übersät mit weißen bis hellrosanen Blüten, die Insekten (Vogelfutter) anlocken; ab dem Spätsommer viele leuchtend rote Früchte, sie haften oft bis in den Winter hinein und dienen Vögeln als Futterquelle; als Einzelpflanze, im Pflanzkübel oder für Flächenpflanzungen geeignet			

Ziersträucher (Fortsetzung)

	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Größe
	Cotoneaster procumbens 'Streibs Findling'	Kleinblättrige Kriechmispel	P 0,5	8- 10
	Langsam wachsender Bodendecker, 10-15cm hoch; kleine, immergrüne Blätter; im Mai / Juni übersät mit weißen Blüten, die Insekten (Vogelfutter) anlocken; ab August leuchtend rote Früchte, sie dienen Vögeln als Nahrung; für Steingärten oder Grabbepflanzungen geeignet			
	Malus x cult.'Evereste' -R-CAC	Zier-Apfel	C 5	60- 100
	Aufrechter Großstrauch, 4-6m hoch; dunkelgrüne Blätter; im Mai erscheinen aus zahlreichen rosa Knospen weiße Blüten mit leicht rosanen Streifen, sie bieten Bienen viel Nektar; im Herbst orangerote 2-2,5cm dicke Äpfel, die herabgefallen bei Weichfutter fressenden Vögeln beliebt sind; robuste Sorte			
	Physocarpus opulifolius 'Andre'	Blasenspiere	C 5	60- 100
	Aufrechter Strauch mit bogig überhängendem Wuchs, bis 2m hoch und breit; dreilappiges Laub im Austrieb mit goldgelber Mitte, später intensiv rot gefärbt; im Mai / Juni weiße Blüten, die attraktiv über dem Laub stehen und Insekten Nahrung bieten; anschließend werden attraktive rote Samenstände ausgebildet, Vögel nutzen sie gerne als Futterquelle			
	Physocarpus opulifolius 'Center Glow'	Rotlaubige Blasenspiere	C 5	60- 100
	Aufrechter Strauch mit bogig überhängendem Wuchs, bis 2m hoch und breit; dreilappiges Laub im Austrieb mit goldgelber Mitte, später intensiv rot gefärbt; im Mai / Juni weiße Blüten, die attraktiv über dem Laub stehen und Insekten Nahrung bieten; anschließend werden attraktive rote Samenstände ausgebildet, Vögel nutzen sie gerne als Futterquelle			
	Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-	Rotlaubige Blasenspiere	C 5	60- 100
	Aufrechter Strauch mit bogig überhängendem Wuchs, 2-2,5m hoch und breit; dreilappiges Laub mit kupferfarbenem Austrieb, später metallisch dunkelrot gefärbt; im Mai / Juni weiße bis hellrosane Blüten, die attraktiv über dem Laub stehen und Insekten Nahrung bieten; anschließend werden attraktive rote Samenstände ausgebildet, Vögel nutzen sie gerne als Futterquelle; für Hecken oder zur Einzelpflanzung			
	Physocarpus opulifolius 'Tiny Wine' -R-	Kleine rotlaubige Fasanenspiere	C 5	60- 100
	Kleinstrauch, mit niedrigem kompaktem, dichttriebigem Wuchs, etwa 1,2 m hoch; kleine, dunkel weinrote Blätter mit leuchtend roter Herbstfärbung; im Juni aus rosa Knospen reinweiße Blüten, die attraktiv über dem Laub stehen und Insekten Nahrung bieten; anschließend werden attraktive rote Samenstände ausgebildet, Vögel nutzen sie gerne als Futterquelle; optimal für Gefäße und kleine Gartenräume			
	Pyracantha coccinea 'Red Column'	Feuerdorn	C 3 gestäbt	80- 100
	Sparriger, bedornter Strauch mit straff aufrechtem Wuchs, 2-2,5m hoch und breit; kleines immergrünes Laub; im Mai / Juni viele weiße Blüten; ab September leuchtend rote Früchte (Vogelfutter); für Einzelstellung oder undurchdringliche Hecken verwendbar, die gerne von Vögeln zum Nisten genutzt werden			

Zier-Äpfel sind bei Weichfutter fressenden Vögeln, z.B. den Drosseln, beliebt

attraktive Fruchtstände des Physocarpus

Früchte der beliebten rotbeerigen Pyracantha coccinea 'Red Column'

Ziersträucher (Fortsetzung)

Pyracantha x cult.'Orange Charmer' ist auch blühend äußerst attraktiv, und wird bei Vögeln, wie der Heckenbraunelle, als geschützter Brutplatz sehr geschätzt

Pyracantha x cult.'Teton' trägt im Herbst überreich Früchte

Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Größe
Pyracantha coccinea 'Soleil d'Or'	Feuerdorn	C 3 gestäbt	80- 100
Sparriger, bedornter Strauch mit breitbuschigem Wuchs, 1,5-2m hoch und 1-1,5m breit; kleines immergrünes Laub; im Mai / Juni viele weiße Blüten; ab September lang haftende, leuchtend gelbe Früchte (Vogelfutter); für Einzelstellung oder undurchdringliche Hecken verwendbar, die gerne von Vögeln zum Nisten genutzt werden			
Pyracantha x cult.'Orange Charmer'	Feuerdorn	C 7,5 gestäbt	100- 125
Sparriger, bedornter Strauch mit breitbuschigem Wuchs, 2-2,5m hoch und bis 3m breit; kleines immergrünes Laub; im Mai / Juni viele weiße Blüten; ab September lang haftende, orangene Früchte (Vogelfutter); für Einzelstellung oder undurchdringliche Hecken verwendbar, die gerne von Vögeln zum Nisten genutzt werden			
Pyracantha x cult.'Orange Glow'	Feuerdorn	C 3 gestäbt	80- 100
Sparriger, bedornter Strauch mit aufrechtem Wuchs, 2,5-3,5m hoch und bis 2m breit; kleines immergrünes Laub; im Mai / Juni viele weiße Blüten; ab September lang haftende, orangerote Früchte (Vogelfutter); für Einzelstellung oder undurchdringliche Hecken verwendbar, die gerne von Vögeln zum Nisten genutzt werden			
Pyracantha x cult.'Teton'	Feuerdorn	C 7,5 gestäbt	80- 100
Sparriger, bedornter Strauch mit aufrechtem Wuchs, 1,5-2m hoch und bis 1,5m breit; kleines immergrünes Laub; im Mai / Juni viele weiße Blüten; ab September gelborangene, lang haftende Früchte (Vogelfutter); für Einzelstellung oder undurchdringliche Hecken verwendbar, die gerne von Vögeln zum Nisten genutzt werden			

Sträucher mit Wildcharakter

	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Größe
die Nüßchenfrüchte des Carpinus betulus werden von Samen fressenden Vögeln, wie dem Kernbeißer, verzehrt				
	Amelanchier lamarckii	Kupfer-Felsenbirne	C 10	125- 150
			Sol C 30	175- 200
	Mehrstämmiger Großstrauch, 4-6m hoch; sommergrünes Laub mit leuchtender Herbstfärbung von gelb über orange bis rot; im April unzählige cremeweiße Blüten, die Bienen Nektar und Pollen liefern; im Juni zahlreiche schmackhafte Früchte, die zu Marmelade verarbeitet werden können, oder Vögeln als Futter dienen			
	Berberis thunbergii	Grüne Hecken-Berberitze	C 3	40- 60
	Mittelhoher, dicht verzweigter Strauch, 2-3m hoch; sommergrünes Laub; im Mai auffallend gelb-rötliche Blüten, die Insekten (Vogelfutter) anlocken; optimal als dornige Hecke geeignet, diese werden von Vögeln gerne zum Brüten genutzt			
leuchtend rote Früchte des Cornus mas	**Berberis thunbergii 'Atropurpurea'**	Rote Hecken-Berberitze	C 3	40- 60
	Mittelhoher, dicht verzweigter Strauch, 2-3m hoch; sommergrünes rötlich-braunes Laub; im Mai auffallend gelb-rötliche Blüten, die Insekten (Vogelfutter) anlocken; gut als dunkle Hecke geeignet, diese wird gerne als Brutplatz genutzt			
	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'	Kleine Blut-Berberitze	C 3	30- 40
	Dichtbuschiger Zwergstrauch, bis 0,6m hoch und 1m breit; sommergrünes, weiches, rötlich-braunes Laub mit leuchtend roter Herbstfärbung; im Mai gelbe bis rötliche Blüten, welche Insekten (Vogelfutter) anlocken; für niedere Einfassungen geeignet			
	Carpinus betulus	Hainbuche, Weißbuche	Hei C 5	125- 150
			Hei C 7,5	175- 200
	Mittelgroßer Baum mit kegelförmiger Krone, ungeschnitten 10-20m hoch wachsend; hellgrüne Blätter mit leuchtend gelber Herbstfärbung, die vertrockneten Blätter haften oft bis zum Frühjahr; die Nüsschenfrüchte dienen zahlreichen Vögeln als Nahrung; wird gerne als Heckenpflanze verwendet und von Vögeln zum Nisten genutzt, heimisches Wildgehölz			
die Beeren des Cornus sanguinea dienen z.B. Amseln als Futterquelle	**Cornus mas**	Kornelkirsche	C 7,5	60- 80
	Großstrauch, sparrig verzweigt, 5-7m hoch; im März / April gelbe, kugelige Doldenblüten, frühe Nahrungsquelle für Bienen; im August viele 2cm große eiförmige, rote Früchte, können roh verzehrt oder zu Marmelade und Likör verarbeitet werden, gerne nehmen sie auch Vögel als Nahrung an; heimisches Wildgehölz			
	Cornus sanguinea	Blutroter Hartriegel	C 3	60- 100
	Mittelhoher Strauch, anfangs aufrecht, später breit ausladend, 3-4m hoch; im Mai/ Juni weiße, streng duftende Blüten; danach kugelige schwarzviolette Früchte, roh leicht giftig, dienen Vögeln als Nahrung; anspruchsloses heimisches Gehölz			

Sträucher mit Wildcharakter (Fortsetzung)

	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Größe
die Früchte des heimischen Weißdorns sind u.a. bei Seidenschwänzen beliebt				
	Corylus avellana	Haselnuss	C 3	40- 60
	Breit aufrecht wachsender, vielstämmiger Großstrauch, 5-7m hoch; ab August / September runde essbare Nuss (Haselnuss), dient Kleibern und Hähern als Nahrung; heimisches Wildgehölz			
	Crataegus monogyna	Eingriffliger Weißdorn	C 5	100- 150
	Großstrauch oder kleiner Baum, 5-7m hoch, bedornt; gelbe bis tiefrote Herbstfärbung; im Mai / Juni weiße Blüten, die Insekten (Vogelfutter) anlocken; ab August runde, rote, essbare Früchte, Verarbeitung zu Gelee/Marmelade oder Likör; der Neuntöter spießt seine Beute an den Dornen auf; Beeren werden von Drosseln und Seidenschwänzen gefressen; idealer, durch Dornen geschützter Brutplatz für Vögel			
Rotkehlchen lieben die attraktiven Früchte des Euonymus europaeus 'Red Cascade'; wegen ihrer Giftigkeit sind sie selten in unseren Gärten zu sehen	**Euonymus europaeus 'Red Cascade'**	Großfrüchtiges Pfaffenhütchen	C 7,5	80- 100
	Breit aufrechter Strauch mit überhängenden Trieben, 7m hoch; sommergrünes Laub mit leuchtend gelber bis roter Herbstfärbung; die nektarreichen Blüten sind bei vielen Insekten, auch Bienen beliebt; im Herbst reifen zahlreiche karminrote schmückende Fruchtkapseln, sie dienen vor allem Rotkehlchen als Vogelfutter; Blätter und Früchte sind für Menschen giftig			
	Hippophae rhamnoides 'Hikul'	Zwerg-Sanddorn	C 12	80- 100
	Zwergstrauch mit kugeligem Wuchs und kurzen, dicht stehenden Trieben, 1-1,5m hoch und breit; attraktives, graugrünes Laub mit kräftig silbriger Bereifung; keine Fruchtausbildung; sie wird als männliche Befruchtersorte für weibliche, fruchttragende Sorten benötigt; äußerst robuste Pflanze			
	Hippophae rhamnoides 'Orange Energy' -R-	Sanddorn	C 5	60- 100
	Stark wachsender Fruchtstrauch (weiblich) mit breit aufrechtem Wuchs und leicht bedornten Trieben; große, tief orangene Beeren, die ab Mitte September geerntet werden können, gut pflückbar; sehr ertragreiche Fruchtsorte mit hohem Vitamin-C-Gehalt, z.B. zur Geleeherstellung geeignet, die Beeren sind auch bei Vögeln sehr beliebt; benötigt eine männliche Befruchtersorte zur Fruchtausbildung			
um leuchtend orangene Sanddornfrüchte zu bekommen ist ein männlicher Befruchterstrauch nötig	**Juniperus com.'Hibernica'**	Irischer Säulen-Wacholder	3xv mB	80- 100
	Langsam wachsende, dichtverzweigte Säulenform mit schmalem Wuchs, 3-4m hoch; attraktive bläulichgrüne Benadelung; bildet wenige Beeren aus; zur Einzelstellung im Heide- und Steingarten oder fürs Grab geeignet; bei Vögeln beliebtes Nistgehölz			
	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	Immergrüner Hecken-Liguster	C 5	60- 100
	Aufrecht wachsender Strauch, ungeschnitten 2-3m hoch; wintergrüne, dunkelgrüne Blätter, im Winter bläulich-braun verfärbt, bietet Vögeln auch dann noch etwas Sichtschutz; im Juni weiße Blüten mit angenehmem Duft, der Insekten (Vogelfutter) anlockt; im Herbst kleine, glänzend schwarze Beeren, bei Vögeln als Futter sehr beliebt; optimale Heckenpflanze, die gerne auch als Brutplatz genutzt wird; heimisches Gehölz			

Sträucher mit Wildcharakter (Fortsetzung)

	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Größe
für Menschen sind die Beeren der Lonicera xylosteum ungenießbar				
	Lonicera xylosteum	Rote Heckenkirsche	Sol C 15	100- 125
	Aufrechter, breitwüchsiger Strauch, 2-3m hoch und breit; im Mai / Juni unauffällige gelb-weiße Blüten, werden von Bienen, Kleinschmetterlingen, Hummeln und weiteren Insekten bestäubt (Vogelfutter); im Juli ungenießbare, rote glänzende Früchte, bei Vögeln beliebt; heimisches Gehölz			
	Mahonia aquifolium 'Apollo'	Niedrige Mahonie	C 3	30- 40
	Kleinstrauch, 0,6-1m hoch und breit; immergrünes, bedorntes Laub, im Winter teils purpur; im April / Mai gelbe intensiv süß duftende Blüten mit hohem Nektar- und Pollengehalt, frühe Nahrungsquelle für Bienen und weitere Insekten (Vogelfutter); ab August Vitamin C haltige, blauschwarze Beeren, die zu Gelee, Marmelade oder Fruchtwein verarbeitet werden können, oder als Vogelfutter dienen; sehr robuste Pflanze			
die Früchte der Mahonia aquifolium werden in Nordamerika zu Marmelade oder Fruchtwein verarbeitet	**Prunus padus CAC**	Trauben-Kirsche	Sol C 20	200- 250
	Großer Strauch oder kleiner Baum, 6-10(15)m hoch; im April / Mai weiße, traubenförmige Blüten mit starkem Duft der Bienen und weitere Insekten anlockt (Vogelfutter); im Spätsommer erbsengroße kugelige Früchte, zuerst rot, dann schwarz, die bitter-süß-sauren Beeren könne roh, als Marmelade oder Likör zubereitet werden, Vögel nehmen sie gerne als Futter an; heimisches Gehölz, dient auch als Futterpflanze für Schmetterlingsraupen			
	Prunus spinosa CAC	Schlehe	C 5	60- 100
	Aufrechter sparriger Strauch, dornig, 3-5m hoch; im März / April weiße, duftende Blüten mit gutem Nektarwert, dient Bienen, Schmetterlingen und weiteren Insekten als Nahrung (Vogelfutter); ab September blaue, kugelige Früchte, nach dem Frost genießbar, z.B. zu Likör, Gelee oder Saft verarbeitet, Vögel nehmen sie auch gerne als Futter an; heimisches Gehölz			
	Rhamnus frangula	Gewöhnlicher Faulbaum	Sol C 20	125- 150
	Hoher Strauch mit lockerem Wuchs, 2-4m hoch und 3m breit; im Mai / Juni unscheinbare, gelblich-weiße Blüten, Nahrungsquelle für Bienen und weitere Insekten (Vogelfutter); im Herbst rote bis schwarze, erbsengroße Früchte, die Vögeln als Nahrung dienen; anspruchsloses, heimisches Gehölz, Raupenfutterpflanze des Zitronenfalters			
Hagebutten der Rosa glauca sind bei Vögeln sehr beliebt, für Marmelade ist der Fruchtmarkgehalt zu gering	**Rosa canina**	Hunds-Rose	C 3	60- 100
	Schnell wachsender Strauch mit stacheligen, bogig überhängenden Zweigen, bis 3m hoch und breit; im Mai / Juni rosa- weiße Blüten, liefert Pollen für Bienen und weitere Insekten; ab Oktober dicke, eiförmige, scharlachrote, Vitamin C reiche Früchte (Hagebutten), die zu Marmelade oder Tee verarbeitet werden können, oder als Nahrungsquelle für Vögel dienen			
	Rosa glauca	Bereifte Rose	C 3	60- 100
	Strauch mit locker aufrechtem Wuchs, bis 3m hoch und breit; dekoratives rot-grünes Laub; im Juni / Juli blaurote bis purpurrote Blüten mit weißer Mitte, liefert Pollen für Bienen und weitere Insekten; mittelgroße, kugelige leuchtend rote Hagebutten, mit relativ wenig Fruchtmarkt, gutes Vogelnährgehölz			

Sträucher mit Wildcharakter (Fortsetzung)

	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Größe
	Rubus frut.'Theodor Reimers' CAC	Brombeere	C 2	
	Sehr stark wachsender Strauch mit bedornten Trieben, ohne Gerüst flach rankend; von Mai bis August einfache, weiße Blüten, guter Nektar- und Pollenspender für Bienen und weitere Insekten (Vogelnahrung); von Ende Juli bis Ende September mittelgroße, rundliche, schwarze Beeren, die roh verzehrt oder zu Saft, Gelee oder Marmelade verarbeitet werden können, Vögel lieben die Beeren ebenfalls; wild wachsende Brombeergestrüppe bieten Vögeln einen optimalen Schutz vor Feinden			
Sambucus nigra ist Nährgehölz für etwa 40 Vogelarten, z.B. die Blaumeise	**Sambucus nigra**	Schwarzer Holunder	C 7,5	60- 80
	Stark wachsender mehrstämmiger Großstrauch 5-7m hoch, bis 4m breit; von Juni - August weiße, duftende Blütendolden, die Insekten (Vogelfutter) anlocken; ab Juli schwarze Beeren, roh schwach giftig, gekocht genießbar, Futterpflanze für etwa 40 Vogelarten; alte Pflanzen habe oft morsche Äste oder Astlöcher, die von Höhlenbrütern, wie z.B. Blau- oder Kohlmeisen gerne als Nistmöglichkeit genutzt werden; heimisches Wildgehölz			
unreife und reife Früchte des Viburnum lantana	**Taxus baccata 'Westerstede'**	Eibe	C 15	80- 100
	Breit aufrechte, im Alter kegelförmige Konifere, 4-6m hoch; dunkelgrüne Nadeln; fleischige, rote Früchte (Vogelfutter); die Nadeln und Samen der Eibe sind giftig, ideale Heckenpflanze (Vogelnistgehölz), sehr schnitt- und schattenverträglich			
	Viburnum lantana	Wolliger Schneeball	C 7,5	100- 125
	Aufrechter, buschiger Strauch, 1,5-3,5m hoch und breit; im Mai halbkugelige, weiße Blüten, streng duftend, Bestäubung durch Bienen und andere Insekten; ab Juli rote, später schwarzblaue Früchte (Vogelfutter); heimisches Wildgehölz			
	Viburnum opulus	Gewöhnlicher Schneeball	C 7,5	80- 100
	Breit ausladender Großstrauch, bis 4m hoch und breit; im Mai / Juni rahmweiße Blüten, Bestäubung durch Bienen und andere Insekten; leuchtend rote Früchte (Vogelfutter); für halbschattigen Standort; heimisches Wildgehölz			
die leuchtend roten Früchte des Viburnum opulus 'Compactum' haben auch einen hohen Zierwert	**Viburnum opulus 'Compactum'**	Zwerg-Schneeball	Sta C 12	Sth. 80
	Kleinstrauch mit kugeligem, gedrungenem, dicht verzweigtem Wuchs, 1-1,5m hoch und breit, meist auf Stämmchen veredelt; blüht im Mai / Juni in weißen Dolden, die durch Bienen und andere Insekten bestäubt werden; im Herbst leuchtend rote, lang haftende zierende Früchte (Vogelfutter)			

Bäume

einige Vogelarten benötigen außer Sträuchern auch Bäume, die sie als Start- und Landeplätze nutzen, in denen sie ihre Nester bauen oder an deren Baumstämme sie klettern können; auch für ihren Gesang schätzen sie Sitzplätze auf Ästen in sicherer Höhe

ein Kleiber beim Klettern an einem Baumstamm

Die Vogelbeere ist eines der wichtigsten Vogelnährgehölze für 60 Vogelarten, u.a. den Dompfaff

Früchte des recht seltenen Sorbus domestica

	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Größe
	Acer platanoides 'Globosum'	Kugel-Ahorn	H C 30	8- 10
	Kleiner Baum, Krone in der Jugend kugelig, im Alter verflachend, ohne Rückschnitt 3-4 m hoch und 5-7 m breit; im April vor dem Laubaustrieb übersät mit attraktiven gelbgrünen Doldenblüten, die Bienen reichlich Nektar bieten; lebhaft grüne Blätter mit goldgelber Herbstfärbung; in trockenen Sommern mehltauanfällig, ansonsten anspruchslos, idealer Vogelnistbaum			
	Fagus sylvatica	Rot-Buche	Hei C 7,5	100- 125
	Großer Baum mit ausladender Krone, 25-30m hoch; dunkelgrüne, glänzende Blätter, im Herbst leuchtend gelb bis rotbraun gefärbt; im September / Oktober reifen zahlreiche Bucheckern, die Vögeln und Kleinsäugern (u.a.Eichhörnchen) als Nahrung dienen; für Einzelstellung oder geschnitten als hohe Hecke; Kleiber nutzen den Stamm zum Klettern; heimisches Gehölz			
	Prunus av.'Burlat' CAC	Süßkirsche	ha C 10 ab 6 cm	
	Mittelgroßer Baum, 4-6m hoch und 4m breit; im Mai zahlreiche weiße Blüten, die Bienen reichlich Nektar und Pollen liefern; in der 1.-2. Kirschwoche (Ende Mai bis Mitte Juni) sehr große, dunkelrote, feste, süße Früchte, die auch bei Vögeln beliebt sind; robuste Sorte mit hohem Ertrag, wird oft im Erwerbsobstbau verwendet; die Wildart ist heimisch			
	Sorbus aucuparia	Vogelbeere	Hei C 20	200- 250
	Kleiner bis mittelgroßer Baum mit lockerer Krone, oft auch mehrstämmig, 6-12m hoch, 4-6m breit; grünes, fiederblättriges Laub mit gelb bis orangeroter Herbstfärbung; im Mai / Juni zahlreiche weiße flache Blütenrispen, die Insekten (Vogelfutter) anlocken; die im Herbst zahlreich erscheinenden leuchtend roten Früchte sind bei Vögeln sehr beliebt; Futterpflanze für über 60 Vogelarten; auch für kleinere Gärten geeignet; heimisches Gehölz			
	Sorbus domestica	Speierling	Hei C 5	80- 100
	Langsam wachsender, rundkroniger Baum bis ca. 10 m hoch; gefiederte Blätter; im Mai weiße Blüten, die durch Bienen und weitere Insekten bestäubt werden; im Herbst 2-4 cm große birnenähnliche Früchte die halbreif zur Mostveredlung Verwendung finden oder überreif zu Marmelade oder Schnaps verarbeitet werden können, auch Vögeln dienen sie als Futterpflanze; wertvoller Wildobstbaum; Nistgehölz für Vögel; sehr seltener heimischer Baum			
	Tilia cordata 'Green Globe'	Kugelförmige Winter-Linde	H C 50	12- 14
	Kleiner Baum mit kugeliger Krone 4-6m hoch und 2-3m breit; kleine, dunkelgrüne, herzförmige Blätter; im Juni / Juli, gelbe, stark und angenehm duftende Blüten in kleinen Trugdolden, liefert Bienen reichlich Nektar und Pollen; Vogelnistgehölz; die Wildart ist heimisch			
	Tilia henryana	Henrys Linde	C 20	100- 125
	Kleiner Baum mit rundlicher Krone, 9-15 m hoch; herzförmige, prächtig gezähnte Blätter; im August cremeweiße, zart und süßlich duftende Blüten, die Bienen reichlich Nektar und Pollen zur Verfügung stellen; für Einzelstellung im Garten oder Park, auffallende Pflanze			

Kletterpflanzen

vor allem an Hauswänden oder Mauern gewachsen bieten Kletterpflanzen Vögeln gut geschützte Nistplätze

Clematis alpina 'Frances Rivis'

eine Mönchsgrasmücke zwischen den Beeren des Hedera helix (Altersform)

Früchte der Parthenocissus tricuspidata im November

Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Größe
Clematis alpina 'Frances Rivis'	Alpen-Waldrebe	C 2 3 Stäbe	60- 100
Kletterpflanze, mit Kletterhilfe 2-3m hoch wachsend; im April / Mai zahlreiche violettblaue glockige Blüten, Nachblüte im August; Pflanze möglichst nicht zurückschneiden, schattenverträglich; Nistplatz für Vögel			
Clematis montana 'Rubens'	Anemonen-Waldrebe	C 2 3 Stäbe	60- 100
Stark wachsende Kletterpflanze, mit Kletterhilfe 6-9m hoch; im Mai / Juni 3-4cm große, anemonenartige Blüten in hellrosa, überreich blühend; Pflanze möglichst nicht zurückschneiden; Nistplatz für Vögel			
Hedera helix	Gewöhnlicher Efeu	P 1 4- 6 Tr.	30- 40
Immergrüne Kletterpflanze, am Boden kriechend, oder mit Haftwurzeln an Bäumen oder Mauern kletternd, im Alter bis 20m hoch; ab einem Alter von etwa 10 Jahren Ausbildung von Blüten, die im September / Oktober reichlich Nektar für Bienen und Insekten liefern; im darauffolgenden Frühjahr reifen die schwarzblauen Früchte aus (Vogelfutter); heimisches Gehölz, ökologisch sehr wertvoll; Nistplatz für Vögel			
Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'	Wilder Wein	C 2 3 Stäbe	60- 100
Stark wachsende Schlingpflanze, mit Haftscheiben an Bäumen oder Wänden 10-15m hoch selbst klimmend; 5teilige bis 10cm lange Blätter mit leuchtend dunkelroter Herbstfärbung; im Juli / August weiße Rispenblüten, die Bienen reichlich Nahrung bieten; im Spätherbst kleine, kugelige blauschwarze Früchte (Vogelfutter); als Fassadenbegrünung guter Nistplatz für Vögel			
Parthenocissus tric.'Green Spring'	Dreilappige Jungfernrebe	C 2 ab 2 Tr.	60- 100
Schnellwachsender mit Haftscheiben kletternder Selbstklimmer, 12-15m hoch; sehr große frischgrüne Blätter, ungeteilt 3-lappig, mit leuchtend purpurroter Herbstfärbung; im Juni / Juli unscheinbare gelblich-grüne Blüten, die Bienen reichlich Nahrung bieten; im Spätherbst kleine, kugelige blauschwarze Früchte (Vogelfutter); als Fassadenbegrünung guter Nistplatz für Vögel			
Vitis 'Galanth' -R-	Tafeltraube	C 3	80- 100
Kräftig wachsende Tafeltraube; ab Mitte August blaurote Beeren in mittelgroßen, lockerbeerigen Trauben, fest-knackiger süßer Geschmack mit leichter Muskatnote; gut frosthart, aber dennoch für geschützten Standort (Weinbaugebiet); sehr hohe Pilzfestigkeit; Beeren sind bei Vögeln sehr beliebt (sofern man es zulässt)			
Vitis 'Phönix'	Tafeltraube	C 3	80- 100
Stark wachsende Tafeltraube; ab Mitte August goldgelbe, große Beeren in lockeren Trauben, süß im Geschmack, gute Erträge; mehltauresistent, sehr gute Pflanzengesundheit; für den Frischverzehr oder die Weinherstellung geeignet; Beeren sind bei Vögeln sehr beliebt (sofern man es zulässt)			

Stauden

hier dienen die Samen als Futter; damit sich aus den Blüten Samen entwickeln können und den Vögeln als Futter zur Verfügung stehen, diese bitte erst im Frühjahr zurückschneiden

	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Größe
	Allium schoenoprasum	Schnitt-Lauch	C 0,75	
	Blüte: violett, einfach, 25 cm, Juni - Juli Blätter: tief-grün, 20 cm, immergrün Standort: Freifläche sonnig, frischer Boden			
	Angelica archangelica	Echte Engelwurz	C 0,75	
	Blüte: grünlich, unscheinbar, 200 - 300 cm, Juni - Juli Blätter: grün , sommergrün Standort: Freifläche sonnig, Boden feucht - naß			
	Centaurea montana	Berg-Flockenblume	P 1	
	Blüte: blau, einfach, 40 cm, Mai - Juli Blätter: tief-grün, 30 cm, sommergrün Standort: Gehölzrand sonnig - absonnig, Boden trocken - frisch			
	Echium vulgare	Gewöhnlicher Natternkopf	P 1	
	Blüte: violettblau, einfach, 80 - 100 cm, Mai - Aug. Blätter: grün , sommergrün Standort: Freifläche sonnig, Boden trocken - frisch			
	Filipendula ulmaria	Sumpf-Mädesüß	P 0,5	
	Blüte: gelblichweiß, einfach, 60 - 150 cm, Juni - Aug. Blätter: grün , sommergrün Standort: Freifläche sonnig, feuchter Boden			
	Typha angustifolia	Schmalblättriger Rohrkolben	P 1	
	Blüte: schwarzbraun, unscheinbar, 160 - 180 cm, Juli - Aug. Blätter: grün, 180 - 200 cm Standort: Wasserrandpflanze, Pflanztiefe: -100 bis -20 cm			
	Typha minima	Zwerg-Rohrkolben	P 1	
	Blüte: braun, unscheinbar, 50 cm, Juni - Juli Blätter: grün, 40 - 60 cm Standort: Wasserrandpflanze, Pflanztiefe: -20 bis -10 cm			
	Verbascum bombyciferum	Seidige Königskerze	P 1	
	Blüte: hell-gelb, einfach, 160 - 180 cm, Juli - Aug. Blätter: grauweiß (silbrig), 40 - 50 cm, wintergrün Standort: Freifläche sonnig, trockener Boden			
	Verbascum olympicum	Kandelaber-Königskerze	P 1	
	Blüte: gelb, einfach, 180 - 200 cm, Juni - Aug. Blätter: graugrün, 40 - 60 cm, wintergrün Standort: Freifläche sonnig, trockener Boden			

Allium schoenoprasum

Angelica archangelica

die Kolben von Typha angustifolia sind bei Kohlmeisen sehr beliebt

Vogelpflanzen - Tabellarische Übersicht		Beeren als Futter	Samen als Futter	Nistplatz / Rückzug	Hecken-pflanze	Haus-baum
Acer platanoides 'Globosum'	Kugel-Ahorn			x		x
Allium schoenoprasum	Schnitt-Lauch		x			
Amelanchier canad.'Rainbow Pillar' -R-	Felsenbirne	x				
Amelanchier lamarckii	Kupfer-Felsenbirne	x				
Angelica archangelica	Echte Engelwurz		x			
Berberis thunbergii	Grüne Hecken-Berberitze	x		x	x	
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	Rote Hecken-Berberitze	x		x	x	
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'	Kleine Blut-Berberitze	x		x	x	
Berberis thunbergii 'Kobold'	Grüne Zwerg-Berberitze	x		x		
Berberis thunbergii 'Maria' -S-	Gold-Berberitze	x		x		
Berberis thunbergii 'Orange Rocket' -R-	Berberitze	x		x		
Carpinus betulus	Hainbuche, Weißbuche		x	x	x	
Centaurea montana	Berg-Flockenblume		x			
Clematis alpina 'Frances Rivis'	Alpen-Waldrebe			x		
Clematis montana 'Rubens'	Anemonen-Waldrebe			x		
Cornus mas	Kornelkirsche	x			x	
Cornus sanguinea	Blutroter Hartriegel	x			x	
Corylus avellana	Haselnuss	x			x	
Cotoneaster apiculatus 'Blackburn'	Preiselbeer-Zwergmispel	x				
Cotoneaster dammeri 'Evergreen'	Immergrüne Teppichmispel	x				
Cotoneaster horizontalis	Fächer-Zwergmispel	x				
Cotoneaster procumbens 'Streibs Findling'	Kleinblättrige Kriechmispel	x				
Crataegus monogyna	Eingriffliger Weißdorn	x		x	x	
Echium vulgare	Gewöhnlicher Natternkopf		x			
Euonymus europaeus 'Red Cascade'	Großfrüchtiges Pfaffenhütchen	x			x	
Fagus sylvatica	Rot-Buche		x	x	x	x
Filipendula ulmaria	Sumpf-Mädesüß		x			
Hedera helix	Gewöhnlicher Efeu	x (im Alter)		x		
Hippophae rhamnoides 'Hikul'	Zwerg-Sanddorn			x	x	
Hippophae rhamnoides 'Orange Energy' -R-	Sanddorn	x		x	x	
Juniperus com.'Hibernica'	Irischer Säulen-Wacholder			x		
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	Immergrüner Hecken-Liguster	x		x	x	
Lonicera xylosteum	Rote Heckenkirsche	x			x	
Mahonia aquifolium 'Apollo'	Niedrige Mahonie	x			x	

Vogelpflanzen - Tabellarische Übersicht		Beeren als Futter	Samen als Futter	Nistplatz / Rückzug	Hecken-pflanze	Haus-baum
Malus x cult.'Evereste' -R- CAC	Zier-Apfel	x				
Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'	Wilder Wein	x		x		
Parthenocissus tric.'Green Spring'	Dreilappige Jungfernrebe	x		x		
Physocarpus opulifolius 'Andre'	Blasenspiere		x		x	
Physocarpus opulifolius 'Center Glow'	Rotlaubige Blasenspiere		x		x	
Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-	Rotlaubige Blasenspiere		x		x	
Physocarpus opulifolius 'Tiny Wine' -R-	Kleine rotlaubige Fasanenspiere		x		x	
Prunus av.'Burlat' CAC	Süßkirsche	x		x		x
Prunus padus CAC	Trauben-Kirsche	x		x		
Prunus spinosa CAC	Schlehe	x		x	x	
Pyracantha coccinea 'Red Column'	Feuerdorn	x		x	x	
Pyracantha coccinea 'Soleil d'Or'	Feuerdorn	x		x	x	
Pyracantha x cult.'Orange Charmer'	Feuerdorn	x		x	x	
Pyracantha x cult.'Orange Glow'	Feuerdorn	x		x	x	
Pyracantha x cult.'Teton'	Feuerdorn	x		x	x	
Rhamnus frangula	Gewöhnlicher Faulbaum	x			x	
Rosa canina	Hunds-Rose	x		x	x	
Rosa glauca	Bereifte Rose	x		x	x	
Rubus frut.'Theodor Reimers' CAC	Brombeere	x		x		
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder	x			x	
Sorbus aucuparia	Vogelbeere	x				x
Sorbus domestica	Speierling	x				
Taxus baccata 'Westerstede'	Eibe	x		x	x	
Tilia cordata 'Green Globe'	Kugelförmige Winter-Linde			x		x
Tilia henryana	Henrys Linde			x		x
Typha angustifolia	Schmalblättriger Rohrkolben		x			
Typha minima	Zwerg-Rohrkolben		x			
Verbascum bombyciferum	Seidige Königskerze		x			
Verbascum olympicum	Kandelaber-Königskerze		x			
Viburnum lantana	Wolliger Schneeball	x			x	
Viburnum opulus	Gewöhnlicher Schneeball	x			x	
Viburnum opulus 'Compactum'	Zwerg-Schneeball	x			x	
Vitis 'Galanth' -R-	Tafeltraube	x		x		
Vitis 'Phoenix'	Tafeltraube	x		x		